

# Кукурудза

Шкідливий об'єкт/дія	Норма витрати	Препарат																							
		Венцедор*	Авіщенко*	Командор Екстра*	Командор Гранд	Альфа-Гейман*	Егалон	Оскар Преміум	Оскар Преміум	Альфа-Бенгазон*	Альфа-Дикамба	Альфа-Ефір	Альфа-Мікс + ПАР Альфалит	Альфа-Піралід*	Ханмер Дуо**	Ханмер + ПАР Бустер	Ранас + ПАР Бустер	Кліч Форте + ПАР Бустер	Кліч Макс + ПАР Бустер	Альфа-Нуфурон + ПАР Бустер	Акутал*	Залт*	Акутал*	Дачи	
Кореневі гнилі, сажкові хвороби, пліснява насіння	1,2 л/т 0,5-0,6 л/т																								
Дрозячки, шведська муха	5-9 л/т 6-8 л/т																								
Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,6-2,1 л/га 1,5-3,0 л/га 3,5-4,0 л/га																								
Іржа, гелмінтоспориоз та інші плямистості	0,5-1,0 л/га 2,0-4,0 л/га 0,4-0,8 л/га																								
Однорічні багаторічні дводольні та коренецяткові бур'яни	0,7-0,8 л/га 10-15 л/га + 0,1 л/100 л води 1,0 л/га 0,3-0,5 л/га																								
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	20-25 л/га + 0,1 л/га 40-50 л/га + 0,1 л/га 50 л/га + 0,1 л/га 40-50 л/га + 0,1 л/га 50-70 л/га + 0,1 л/га																								
Кукурудзаний стебловий негелік	1,2-2,0 л/га 1,5 л/га																								
Обробка складів та зерна для зберігання	16 мл/т; 0,5 мл/м <sup>2</sup> 3 табл/т																								
Позакореневе підживлення	2,0-3,0 л/га 1,0-3,0 л/га 1,0 л/га																								

\* світовий досвід застосування

\*\* в процесі реєстрації

Фази	ВВСН	Насіння	До появи сходів	Сходи	3-5 листків	6-7 листків	8-10 листків	Вкладання волоті	Цвітіння	Повна стиглість	Склад
	ВВСН	00	07	10-11	13-15	16-17	18-20	51-59	61-69	89-97	

# Со́я

Шкідливий об'єкт/дія	Норма витрати	Препарат																										
		Командор Гранд*	Егалон*	Альфа-Гейман*	Конкур*	Альфа-Прометрин*	Оскар Преміум*	Альфа-Бенгазон	Альфа-Мікс + ПАР Альфалит	Антизілкс* + ПАР Омега, (Омега Екстра)	Козак*	Кайман**	Альфа-Табусол*	Тезис	Фенікс Дуо*	Камелот*	Болівар Форте*	ДОК Про	Супербізон	Нокаут*	Наповал*, Разит**	Нокаут Екстра	Бластер	Альфа-Дикавт*	Опанан Екстра*	Отванан*, Сокар*		
Комплекс шкідників сходів	1,0-1,5 л/т 1,5-3,0 л/га 1,6-2,1 л/га																											
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	0,5-0,7 л/га 3,0-5,0 л/га 3,5-4,0 л/га																											
Однорічні дводольні бур'яни	1,5-3,0 л/га 6-8 л/га + 0,1 л/100 л води 0,4-0,8 л/га + 1,2-2,4 л/га, (1,0 л/га)																											
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	0,4-1,8 л/га 0,6-1,0 л/га 1,0 л/га 0,5 л/га																											
Борошниста роса, антракноз, іржа, альтернариоз, фомоз, фомоспорова гниль	0,5-0,6 л/га 0,25-0,5 л/га 0,5-0,75 л/га																											
Пероноспороз, іржа, альтернариоз, антракноз, сіра та біла гнилі	0,4-0,6 кг/га																											
Акацієва вогнівка, совки, трипси	1,0 л/га 0,15-0,25 л/га 0,1-0,2 л/га																											
Кліщі (в т.ч. яйця)	0,075-0,125 л/га 0,2-0,25 кг/га																											
Десикація	2,0-3,0 л/га 2,0-2,5 л/га 3,0-4,0 л/га																											
Позакореневе підживлення	2,0 л/га 1,0 л/га																											

\* світовий досвід застосування

\*\* в процесі реєстрації

Фази	ВВСН	Насіння	До появи сходів	Сходи	1-й трійчастий лист	3-й трійчастий лист	Пігування	Цвітіння	Розвиток бобів	Дозрівання
	ВВСН	00	07	10	12	14	21-29	60-69	70-79	89-92