



























# Зерняткові сади

Шкідливий об'єкт/дія	Норма витрати	Препарат	Фази
Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0-5,0 л/га	Отаман*, Соляр*	
	1,4-4,0 л/га	Отаман Екстра	
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	1,0-3,0 л/га, (0,4-1,0 л/га)	Багіра Супер*, (Льбера**) Кайман**	
	0,6-1,0 л/га		
Парша, бугорчатість, борошниста роса, альтернаріоз	1,5-2,0 кг/га	Альфа-Мідь*	
	0,18-0,22 л/га	Камелот	
	0,5-0,75 л/га	Болівар Форте*	
	0,2-0,3 л/га	Тезис*	
	0,15-0,25 л/га	Нокаут*	
	0,075-0,125 л/га	Нокаут Екстра*	
	2,0 л/га	СуперБізон*	
	1,0-1,5 л/га	Залп*	
	0,20-0,25 л/га	Командор*	
	0,15-0,20 л/га	Наповал*, Разит**	
Кліщі (в т.ч. яйця)	0,15-0,2 кг/га	Альфа-Ацетаміприд*	
	0,4-0,5 кг/га	Бластер*	
Позакореневе підживлення	1,0 л/га; 3,0-4,0 л/га	НАЙС Бор	              
	1,0-1,25 л/га	НАЙС Цинк	

\* світовий досвід застосування  
\*\* в процесі реєстрації

# Кісточкові сади

Шкідливий об'єкт/дія	Норма витрати	Препарат	Фази		
Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0-5,0 л/га	Отаман*, Соляр*			
	1,4-4,0 л/га	Отаман Екстра			
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	1,0-3,0 л/га, (0,4-1,0 л/га)	Багіра Супер*, (Льбера**) Кайман**			
	0,6-1,0 л/га				
Клестеростріоз, монілоз, кокнікоз, кучерявість листя, бактеріальний опік	4,0 кг/га	Альфа-Мідь*			
	0,30-0,35 л/га	Камелот*			
	0,8-1,2 л/га	Актуал*			
	0,20-0,25 л/га	Командор*			
	1,2-2,0 л/га	СуперБізон*			
	0,15-0,20 л/га	Наповал*, Разит**			
	0,2-0,3 кг/га	Бластер*			
	Позакореневе підживлення	1,0 л/га; 3,0-4,0 л/га		НАЙС Бор	              
		1,0-1,25 л/га		НАЙС Цинк	

\* світовий досвід застосування  
\*\* в процесі реєстрації