

Виноград

Шкідливий об'єкт/дія	Норма витрати	Препарат					Формування ягід, дозрівання плодів	Дозрівання
		Отаман*, Солар	Отаман Екстра	Багіра Супер*, (Лобера**)	Кайман**	Препарат		
Однорічні, багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0-5,0 л/га 1,4-4,0 л/га							
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	1,0-3,0 л/га, (0,4-1,0 л/га) 0,6-1,0 л/га							
Чорна плямистість, мльавосидіум, сира та біла гниль	3,0 кг/га	Альфа-Мідь*						
	2,0-2,3 кг/га			Десфілар*	Десфілар*			
	0,4 л/га			Альфа-Табузол*	Альфа-Табузол*			
	0,2 л/га			Тезис*	Тезис*			
	0,15-0,20 л/га			Камелот*	Камелот*			
	0,3-0,4 л/га			Болівар Форте*	Болівар Форте*			
Листкова форма філоксери, кліщі, листовійки	0,4 кг/га			ДОК Про*	ДОК Про*			
	2,0-3,0 л/га			СуперБізон	СуперБізон			
	0,20-0,25 л/га			Командор	Командор			
	0,15-0,25 л/га			Нокаут*	Нокаут*			
	0,075-0,125 л/га			Нокаут Екстра*	Нокаут Екстра*			
	0,1-0,2 л/га			Напсвалл*, Разит**	Напсвалл*, Разит**			
Кліщі (в т.ч. яйця)	0,12-0,18 кг/га			Бластер*	Бластер*			
Позакореневе підживлення	1,0 л/га 2,0 л/га			НАЙС Цинк	НАЙС Бор			
* світовий досвід застосування ** в процесі реєстрації								



Фази

Розпускання бруньок

2-4 листка

Ріст пагонів

Утворення суцвіть

Цвітіння

Формування ягід, дозрівання плодів

Інтенсивний ріст ягід

Дозрівання

